ANÁLISE COMPARATIVA DOS MOTIVOS DE RETIRADA NÃO ELETIVA DO CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA NA UNIDADE NEONATAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE (HMJCF)

Avaliação e Qualidade do Cuidado

Maria Aparecida Vieira Diniz Lopes; Meire Marques Guimarães; Karen Mendes Borges; Maria Cristina Pose Guerra; Renata Mantovani

INTRODUÇÃO

Atualmente o Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) é o dispositivo mais utilizado nas Unidades de Neonatologia (UTINN) devido a gama de benefícios se comparado a outros cateteres¹, o enfermeiro capacitado, amparado na Resolução Cofen-258/2001 pode realizar a passagem do cateter².

OBJETIVO

Realizar uma análise comparativa dos motivos de retirada não eletiva do PICC na UTINN do HMJCF.

METODOLOGIA

Estudo descritivo, documental, com abordagem quantitativa. Realizado por levantamento do banco de dados referente ao número de PICCs inseridos no período de JAN/SET de 2017-2018.

RESULTADO

Contabilizamos 190 cateteres inseridos em 2017 e em 2018 195 cateteres, destes: Tivemos aumento no número de perdas por óbito, sinais de infecção corroborando com a maioria dos estudos realizados sobre o assunto e infiltração, ressaltando que em 100% das infiltrações os cateteres estavam periféricos

CONCLUSÃO

Os dados mostram melhora das taxas na maioria dos itens no ano de 2018 em relação a 2017, tivemos uma diminuição significativa de retirada por motivos evitáveis como: obstrução, rompimento, exteriorização, extravasamento e outros. Atribuímos o resultado a qualificação da equipe de enfermagem e aquisição do PICC 2.0 Fr pela instituição. Os motivos de remoção não eletivas indicaram necessidade de estratégias para prevenção de complicações evitáveis relacionadas ao PICC.

REFERÊNCIAS:

TINISHA M. *et al.* First Golden Hour of Life. **Advance in Neonatal Care**. Vol.16, No. 4, pp.264-272. Copyright 2016 National Association of Neonatal Nurses Unautothorized rencoduction of this article is prohibited.