Martins MR; Chaves MC; Trecco SMLS, Evazian D

Divisão de Nutrição e Dietética do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

Introdução

A dieta de baixo teor de carboidratos fermentáveis (FODMAPs) tem sido utilizada na promoção da melhora dos sintomas gastrointestinais de pacientes com Síndrome do Intestino Irritável (SII), uma doença evidenciada por dor abdominal e alteração nos hábitos intestinais.

Objetivo

Sistematizar o atendimento nutricional para pacientes ambulatoriais com SII, com dieta de baixo teor de FODMAPs.

Método

Foi elaborado um fluxo de atendimento nutricional para pacientes com SII, composto por três etapas: uma de exclusão dos alimentos com alto teor de FODMAPs (frutose, lactose, sorbitol, galactooligosacarídeos, manitol e frutanos), uma de testes de reintrodução de subgrupos dos FODMAPs e uma etapa de individualização do plano alimentar. Para isso, foi elaborado um plano alimentar baixo em FODMAPs, passível de adaptações e um impresso de orientações nutricionais específicas, além de definição de critérios de inclusão e exclusão de pacientes.

Resultados

Conclusão

A sistematização do atendimento nutricional para pacientes com Síndrome do Intestino Irritável por meio da dieta de baixo teor de FODMAPs é importante para a padronização das condutas entre os nutricionistas em cada etapa do processo de orientação.