Impacto no consumo de álcool gel após estratégia de dispensação individualizada: experiência de uma Unidade de Terapia Intensiva Adulto de uma instituição privada no município de São Paulo

Coutinho, RL; Moraes, TG; Santos, RC; Santos, CJ; Rodrigues, C.

Introdução: A higienização das mãos (HM) é uma das medidas primárias mais eficazes no controle e na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Várias estratégias são relatadas na literatura com o objetivo de conscientizar os profissionais da área da saúde (PAS)

Materiais e métodos: analisando-se os dados referentes a 2017, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) observou na Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI) uma elevação na incidência das infecções primárias da corrente sanguínea associadas a cateter venoso central, assim como uma dificuldade no consumo sustentado de solução alcóolica pelos PAS. Por iniciativa da supervisora de enfermagem da UTI e apoiada pelos profissionais do SCIH, a partir de julho de 2018 toda a equipe de enfermagem passou a receber um “pump” de álcool gel individual, com identificação nominal. A data da entrega era registrada em formulário assinado pelo profissional assim como cada reposição ao término de cada “pump”.

Resultados: com a implantação desta estratégia individualizada de dispensação de solução alcóolica, foi observado um aumento do consumo médio entre o primeiro e segundo semestre de 2018 de 70,3 ml-paciente- dia para 120,5 ml-paciente-dia (↑ 71%).

Conclusão: a estratégia de individualização na dispensação de soluções alcóolicas permite a identificação de PAS menos aderentes às práticas de HM, direcionando ações educativas mais específicas e eficientes.

Bibliografia: Manual de Referência Técnica para a Higiene das Mãos. ANVISA, 2015.